

## *Anecphora angulosa* Strand n. sp. (Fulgoridae).

Von Embrik Strand (Berlin, Kgl. Zool. Museum).

Mehrere Exemplare von Kamerun. Lolodorf (Heyne vend., ♀ Type!); Hinterland, Jaunde Stat. (Zenker) (♂ Type!); Bipindi · Okt. bis Dezember 1896. 30. April 1897 (Zenker).

♀ Ist mit *A. sumptuosa* Gerst. nahe verwandt, weicht aber ab durch das Fehlen einer roten Querbinde auf dem Pronotum, den nicht grünlich gefärbten, aber am Außenrande gezähnten Basalteil der Deckflügel und das hinten weniger ausgedehnte rote Wurzelfeld der Flügel ab: dieses bedeckt bei *sumptuosa* den ganzen Innenrand bis zum Analwinkel, hier dagegen erreicht es den Innenrand nur in dessen Basalhälfte bis zu den basalen zwei Dritteln und ist außerdem im Innenfelde nicht so dunkelrot wie im übrigen Wurzelfeld, die geringste Entfernung desselben vom Hinterrande des Flügels ist hier 3 mm, bei *sumptuosa* kaum halb so weit. Das Basalfeld der Deckflügel ist blaß graugelblich, an beiden Flügelrändern etwa 10 mm, in der Mitte aber 7—8 mm lang und der Außenrand bildet drei etwa rechtwinklige Zähne: je einen an beiden Rändern und einen kurz hinter der Mitte des genannten Randes. Hinterleib dunkelrot, Pronotum gelblich mit je einem schwarzen Fleck hinter den Augen. Skutellum schwärzlich, in der Mitte ein wenig heller. Unterseite des Körpers und Extremitäten braun bis rötlich. — Von *A. aurantiaca* Karsch durch das purpurrote und scharf markierte Wurzelfeld der Flügel, von *A. mucilipennis* Strand durch die Färbung und Form des Wurzelfeldes der Vorderflügel sowie die Färbung des Hinterleibes leicht zu unterscheiden. — Beim ♂ ist der ganze Körper oben sowie Bauch und Beine rot gefärbt, jedoch mit einem hellgelblichen Quersfleck vorn auf dem Pronotum: die Unterseite des Vorderleibes gelblich. Das Wurzelfeld der Deckflügel nur wenig heller als das Endfeld sowie schwach rötlich angehaucht und daher ziemlich undeutlich. — ♂ Flügelspannung 54, Körperlänge 19—20 mm: ♀ beziehungsweise 53 und 19 mm. — Typen im Berliner Museum.